

**Управление Роспотребнадзора по Московской области
напоминает о мерах профилактики энтеровирусных инфекций.**

Энтеровирусные инфекции – группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами, чаще проявляется в виде герпангины, экзантемы, афтозного стоматита, конъюнктивита, диареи, возможно поражение центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и других органов и систем. Наиболее тяжелыми формами ЭВИ являются энтеровирусный менингит и энцефалит, которые начинаются остро с повышением температуры до 39-40°C, сильной головной болью, многократной рвотой, возможны боли в желудке, судороги, спутанное сознание, появление сыпи.

Источником инфекции является только человек - больной или здоровый вирусоноситель. Заболевание проявляется в течение 10 дней от момента заражения, чаще 2-5 дней.

Пути передачи инфекции: водный, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Возбудитель передается через зараженную воду и пищевые продукты, через грязные руки, игрушки, объекты внешней среды, а также при чихании и кашле.

С целью профилактики заболевания энтеровирусной инфекцией рекомендуем придерживаться следующих правил:

- не использовать для питьевых целей воду из водоемов, не предназначенных для питья, употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке;
- не покупать продукты в местах несанкционированной торговли;
- тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением под проточной водой, ополаскивать кипяченой водой, особенно если они предназначены для детей;
- не заглатывать воду при купании в открытых водоемах и бассейнах;
- соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи, после посещения общественных мест, прихода домой с улицы, не забывайте прививать детям правила личной гигиены с самого раннего возраста;
- не допускать ребенка с признаками заболевания в детский сад, школу;
- не заниматься самолечением, вызвать на дом врача из поликлиники по месту жительства или, в случае тяжелого состояния, бригаду скорой медицинской помощи.

Чаще всего инфекция поражает детское население, поэтому особое значение имеет выявление больных в период формирования детских коллективов.

С целью недопущения формирования очагов ЭВИ в организованных детских коллективах (школах, садах и др.) необходимо обеспечить проведение основных профилактических мероприятий:

- ежедневных утренних «фильтров»;
- применение дезинфицирующих средств при уборке помещений, обработке столовой, кухонной посуды, инвентаря и др.;
- проведение среди детей обучающих тематических уроков по правилам личной гигиены;
- усиление со стороны руководителей организаций контроля за выполнением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов (за технологическими процессами и соблюдением принципа поточности, использование одноразовых перчаток при приготовлении и раздаче готовых блюд на пищеблоках, строгим соблюдением питьевого режима, проветриванием помещений, недопущением переуплотнения групп (классов), своевременной изоляцией детей с признаками инфекционных заболеваний).

Помните: любое заболевание легче предупредить, чем лечить!